

	TESSUTO	FASI DI ESPULSIONE	FASI DI INFIAMMAZIONE	FASI DI ACCUMULO
ECTODERMA	a) Epidermide	1. FASI DI ESPULSIONE ECTODERMALE (eliminazione col tessuto di origine ectodermale) a) Fase di espulsione epidermale (con l'epidermide e i suoi tessuti collegati): sudorazione di qualsiasi tipo (specie alle ascelle e ai piedi), lacrime, sebo, cerume, smegma, desquamazione, formazioni sierose. Presenza di tossine nei capelli, nelle unghie, nelle squame cutanee, ormoni della adenoipofisi ecc. Terapie coadiuvanti: sauna, bagni turchi.	1. FASI DI INFIAMMAZIONE ECTODERMALE (sull'ectoderma) a) Fasi di infiammazione epidermale (sull'epidermide e sulle formazioni cutanee connesse): capelli, unghie, ghiandole sebacee, sudoripare e mammarie). - Erisipela - Eczema acuto e cronico - Piodermite - Acne vulgaris - Eritema essudativo multiforme - Dermatite erpetiforme - Eritodermia essudativa multiforme dei neonati - Eritodermia esfoliativa generalizzata - Lichen ruben - Forme di orticaria - Acne rosacea - Micosi quali: pitiriasis versicolore rossa - Blastomicosi - Calazio - Blefarite ciliare - Congiuntivite - Dacriocistite - Ulcera corneale - Cheratite - Foruncolosi - Ascesso delle ghiandole sudoripare - Vulvite acuta - Gonorrea - Mastite.	1. FASI DI ACCUMULO ECTODERMALE (nel tessuto ectodermale) a) Fasi di accumulo epidermale (nell'epidermide): Cheratosi - Calli - Navi - Verruche - Iperpigmentazione - Clasma uterino - Vitiligine - Fasi degenerative dell'adenoiipofisi - Scabbia (penetrazione degli acari su un terreno omotossico e pieno di tossine suine) - Cataratta senile - Condilomi e papilomi - Acne rosacea, ecc.
	b) Oroderma	b) Fasi di espulsione orodermale (con tasche ectodermali; naso, bocca anteriore, ghiandole lacrimali): saliva, muco, lacrime e le omotossine in essi contenute. Prodotti di escrezione delle ghiandole della mucosa orale, enzimi (ptialina ecc.), rinorrea acuta e cronica, ecc.	b) Fasi di infiammazione orodermale (sull'oroderma): rinite, corizza, rinite vasomotoria (soprattutto come evoluzione della fase di impregnazione neurodermale) - Raffreddore da fiato - Difterite nasale - Difterite della mucosa del cavo orale - Stomatite catarrale, ulcerosa, aftosa - Gingivite - Glosseite.	b) Fasi di accumulo orodermale (nell'oroderma): Rinite cronica iperplastica - Ingrossamento delle mucose - Polipi nasali, ecc.
	c) Neuroderma	c) Fasi di espulsione neurodermale (col sistema nervoso); vescicole nell'herpes zoster. Prodotti di escrezione etmoidali, ecc.	c) Fasi di infiammazione neurodermale (sul tessuto nervoso): Herpes zoster - Polineurite acuta - Poliomielite epidermica nello stadio febbrile in fase di espulsione - Poliencefalite e encefalite letargica nello stadio febbrile in fase di espulsione - Nevralgie - Dolore erniario - Ischialgia - Encefalite non purulenta - Herpes labialis - Mielite acuta - Herpes corneale.	c) Fasi di accumulo neurodermale (nel neuroderma): Nevralgie leggere acute e croniche (del trigemino, occipitali, intercostali, ischiagiche, ecc.) - Brachialgia notturna - Nevralgia del duto deferente - Leggere forma di nevralgia e distonia vegetativa - Primo stadio dell'emicrania e dello stomia scintillante - Casi iniziali leggeri di ulcera duodenale e di asma bronchiale - Angina pectoris blanda originata da insufficienza coronarica subentrata ad una leggera scorsosi (colesterica).
	d) Simpaticoderma	d) Fasi di espulsione simpaticodermale (con organi del sistema simpatico quali le cellule neuromonali del rivestimento follicolare della tiroide, dei testicoli, delle ovaie e della carotide; con la midollare del surrene. Eliminazione fisiologiche dalle cellule nervose (colinacetilasi e colinesterasi: sintesi e distruzione dell'acetilcolina).	d) Fasi di infiammazione simpaticodermale (sul tessuto simpatico): esantema da orticaria, demografico sull'ambito dei riflessi semplici che producono infiammazioni simpatiche. Nevralgie di qualsiasi tipo: herpes zoster - Herpes corneale, ecc.	d) Fasi di accumulo simpaticodermale (nel tessuto simpatico): Ulcera duodenale iniziale - Asma bronchiale, angina pectoris, ipertonica essenziale (surrenali), probabilmente anche una larga parte di tutte le nevralgie croniche (iniziati il tessuto simpatico è detto conduttore del dolore).
MESODERMA	a) Interstizioderma	2. FASI DI ESPULSIONE MESODERMALE (con tessuto mesodermale) a) Fasi di espulsione interstiziodermale (con la sostanza fondamentale interstiziale del tessuto connettivo); espulsione continua di acido ialuronico negli spazi interstiziali e di prodotti metabolici degli enzimi intracellulari.	2. FASI DI INFIAMMAZIONE MESODERMICA (con tessuto mesodermale) a) Fasi di infiammazione interstiziodermale (sul tessuto interstiziale): Edema nei casi di malattie da siero e da punture di insetti - Edema della glottide - Ascesso e flemmone - Ascesso retrofaringeo, periproctico, subfrenico, perineitico, paraneitico - Ascessi in qualsiasi localizzazione - Glosseite Angina - Carbonchio - Otite media - Episclerite - Irite - Corioidite - Ulcera corale - Eritema nodoso e essudazione multiforme, ecc.	2. FASI DI ACCUMULO MESODERMALE (nel mesoderma) a) Fasi di accumulo interstiziodermale (nel tessuto connettivo interstiziale): Adiposità, edema, eventualmente evoluzione all'elefantiasi - Lipoma - Migelosi (in parte muscolodermale) - Fegato da stasi e polmoni da stasi - Muco interstiziale di accumulo - Neutralizzazione degli acidi attraverso il legame con la fibra connettiva - Fibromatosi mammaria, ecc.
	b) Osteoderma	b) Fasi di espulsione osteodermale (con la cartilagine, le ossa, il periostio, la dentina): secrezione fisiologica con effetto endocrino.	b) Fasi di infiammazione osteodermale (sulle ossa, sulla cartilagine, sulla dentina): dolori alle ossa nei casi di influenza e di altre infezioni - Mastoidite o otite media con interessamento osseo - Osteomielite acuta - Carie dentarie profonde - Periodontiti - Granulomi dentari - Parodontosi - Spondiliti - Coxiti - Artriti, ecc.	b) Fasi di accumulo osteodermale (sulle ossa, sulla cartilagine, sulla dentina): Peristite cronica, in particolare ispessimento periosteo e deposito di calcio (osteite fibrosa - Exostosi - Spargono calcaneare - Alluce valgo - Prolasso del nucleo poloso (deposito di tossine suine mucose, per cui si ha un ram molimento della cartilagine intervertebrale e uno schiacciamento della persona).
	c) Emoderma	c) Fasi di espulsione emodermale , Produzione di anticorpi. Sanguinamento delle emorroidi, sanguinamento mestruale (germinoderma, mesoderma) emorragie vicarianti (in casi di emicrania, mestruazioni dolorose, apoplessia, ecc.). Terapia coadiuvante: sanguisughe, salassi.	c) Fasi di infiammazione emodermale (sui vasi sanguigni, sul cuore, sugli eritrociti): Scarlattina, Erisipela - Vaiolo - Peste - Endocardite acuta - Sepsis Malaria - Febbre gialla - Malaria del sonno - Spirochetosi - Tromboflebite acuta - Emorragia nasale - Emorriti - Metrorragia - Emorragie di qualsiasi origine non dovute a traumi né da interpretare come fasi di espulsione - Emorragie venose - Emorragie di qualsiasi tipo - Emorragie emorroidarie, ecc.	c) Fasi di accumulo emodermale (nei vasi sanguigni, nel cuore e negli eritrociti): Varici - Sclerosi coronarica - Arteriosclerosi - Angina Pectoris - Insufficienza valvolare e alterazioni muscolari del cuore nei casi di crescita veloce o di errata alimentazione - Vera policitemia - Emangioma - Emorroidi non sanguinanti, ecc.
	d) Linfoderma	d) Fase di espulsione linfodermale (con gli organi e le cellule del sistema linfatico): zaffi tonsillari. Terapie coadiuvanti: spremitura delle tonsille.	d) Fasi di infiammazione linfodermale (sui vasi linfatici e sulle ghiandole linfatiche): Appendicite acuta e cronica - Angina tonsillare - Difterite - Ascesso tonsillare - Ingrossamento delle ghiandole linfatiche nelle malattie da siero - Linfangite e linfadenite - Meningite propagata dalle vie linfatiche - Ascesso polmonare - Mediastinite - Ingrossamento delle ghiandole linfatiche circoscritto a una regione nelle fasi di infiammazione ectodermale o viceversa (casi di crosta latte, dermatite, eczema, vaiolo, ecc.)	d) Fasi di accumulo linfodermale (sull'infoderma): Linfatisimo - Ipertrafia della tonsilla faringea - Tonsillite cronica - Ingrossamento dei linfonodi dell'ilo e mesenterici nella scrofolosi, nell'actinomiosi (evoluzione verso fasi di reazione linfodermale) - Fibromatosi mammaria, ecc.
	e) Cavoderma	e) Fasi di espulsione cavodermale (con le cavità articolari, la borsa muco sinoviale, sullo spazio subaracnoideo e subdurale): liquido sinoviale, liquido cerebrospinale, ecc.	e) Fasi di infiammazioni cavodermale (sulle cavità articolari, sulla borsa mucosa, sul liquido subaracnoideo e subdurale): Poliartrite acuta - Monoartite gonorroica - Infiammazione della borsa mucosa nei vari loci - Meningite epidemica acuta e purulenta, ecc.	e) Fasi di accumulo cavodermale (nei cavi articolari, nel liquido subaracnoideo e subdurale): Idropie delle articolazioni - Artrite deformante, in particolare nello stadio iniziale - Idrocéfalo incipiente (poi fase di degenerazione, ecc.).
	f) Nefroderma	f) Fasi di espulsione nefrodermale : eliminazione di renina, ipertensione, urina - Secrezione dall'uretere, ecc. - Secrezione degli ormoni corticosurrenali (ormoni mineralcorticoidi e glicocorticoidi)	f) Fasi di infiammazione nefrodermale (sui reni, sulla corteccia surrenale e vie urinarie ascendenti di origine mesodermale, uretere): Glomerulonefrite acuta - Pielite acuta e suppurativa, ecc.	f) Fasi di accumulo nefrodermale (dei reni, nella corteccia surrenale e nell'uretere): Nefrolitiasi - Iperensione renale conseguente a idronefrosi - Scarso funzionalità delle ghiandole surrenali (carenza di resistenza alle infiammazioni e tendenza reumatica), ecc.
	g) Sieroderma	g) Fase di espulsione sierodermale : (con le membrane sierose: peritoneo, pericardio, pleura).	g) Fase di infiammazione sierodermale (sulle membrane sierose della pelle): Pielurite secca ed essudativa - Pericardite - Peritonite acuta, ecc.	g) Fasi di accumulo sierodermale (sul sieroderma): Ascite - Versamenti nelle tre cavità sierose.
	h) Germinoderma	h) Fasi di espulsione germinodermale (con l'epitelio delle gonadi e del duto di Muller: tuba, utero e vagina) secrezioni di sperma, succhi prostatici, prodotti di secrezione delle vescicole seminali, delle ghiandole di Cowper. Mestruazione fisiologica.	h) Fasi di infiammazione germinodermale (sul parenchima delle gonadi e sulle trombe di Falloppio, sull'utero e sulla vagina): Infezioni gonorrhoiche - Ovarite - Salpingite - Annessite - Metrite - Endometrite - Piosalpingite - Fluor albus - Aborto - Prostatite - Spermatocistite - Epididimite - Orchite, ecc.	h) Fasi di accumulo germinodermale (nell'epitelio delle gonadi e nei dotti muscolari connessi: trombe di Falloppio, utero, vagina): Oasi ovarica - Ibrocete (ipertrofia prostatica benigna) - Formazione di mioni - Polipi interni - Ometario (ovale come locus minoris resistentiae; deposito di omotossine, alterazioni della funzionalità cellulare) - Vicarizione da fasi di saturazione emoderma (vampate di calore) e fasi di espulsione ectodermali (sudorazione). Anche le menorragie si interpretano come vicarizione nella fase di infiammazione emoderma o germinoderma quando si presenta una fase di accumulo nelle ovaie, ecc.
	i) Muscoloderma	i) Fasi di espulsione muscolodermale (con la muscolatura): Eliminazione di sostanze muscolari e di metaboliti con effetto endocrino (ATP, creatina, acido lattico).	i) Fasi di infiammazione muscolodermale (sul tessuto muscolare): Reumatismo muscolare - Tendovaginite - Miosite acuta, ecc.	i) Fasi di accumulo muscolodermale (nella muscolatura): Migelosi (in parte interstiziodermale), Mialgia reumatica e cronica - Artrite unica - Miosite ossificante, ecc.
ENDODERMA	a) Mucoderma	3. FASI DI ESPULSIONE ENDODERMALE (con l'endoderma) a) Fasi di espulsione mucodermale (con le mucose endodermali): eliminazione di CO ² dai polmoni; di muco dalla tuba di Eustachio, dall'orecchio medio, dalla laringe, dalla trachea, dai bronchi e dagli alveoli; di enzimi digestivi del tratto gastroenterico; di grassi, di metalli pesanti, di sali di calcio, di alcaloidi (specie di morfina), di veleni di serpente e batterici attraverso le mucose originarie dagli epiteli endodermali degli organi urinari e sessuali. Secrezione delle ghiandole accessorie. Terapia coadiuvante: eliminazione dall'intestino.	3. FASI D'INFIAMMAZIONE ENDODERMALE (sull'endoderma) a) Fasi di infiammazione mucodermale (eliminazione attraverso le mucose endodermali dei tratti digerente e respiratorio, ecc.): Faringiti - Laringiti - Tracheobronchiti - Bronchiti - Bronchiolite - Pertosse - Catarro influenzale - Difterite (forma discendente) - Gastrite - Enterite acuta - Dissenteria - Febbre da infiammazione - Asma bronchiale nello stadio di bronchite - Catarro della tuba e dell'orecchio medio - Iperacidità - Dispepsia fermentativa e putrelativa - Enterocolite acuta - Ileo nei casi di colite - Diarrea nervosa - Colite mucosa - Bartoliniti - Gonorrea - Cistite - Iperemesi gravidica.	3. FASI DI ACCUMULO ENDODERMALE (nel tessuto endodermale) a) Fasi di accumulo mucodermale (sulle membrane mucose di origine endodermale): Poliposi nella laringe, vescica urinaria, nel retto - Tendenza alla bronchite cronica - Eritsema iniziale - Processo di canifificazione polmonare - Bronchiectasia - Stitichezza cronica abituale - Stitichezza atonica - Silicosi dei polmoni - Ottosclerosi ecc.
	b) Organoderma	b) Fasi di espulsione organodermale (con gli organi originati dalle tasche endodermiche (cioè dalle cellule parenchimali del fegato, del pancreas, della cistifellea, con le ghiandole epiteliali), con la bile (colesterolo e acidi biliari), con la secrezione dei succhi pancreatici, dell'insulina (secrezioni endocrine), dell'ormone tiroideo e delle ghiandole epiteliali.	b) Fasi di infiammazione organodermale (sugli organi endodermali): Parotite epidemica - Polmonite lobare - Psittacosi - Iliero infettivo - Epatite epidemica - Colelitiasi e colecistiti - Fistola biliare, ecc.	b) Fasi di accumulo organodermale (negli organi endodermali): Formazioni di calcoli biliari, fegato da stasi, ecc.

FASI CELLULARI

	TESSUTO	FASI DI IMBIBIZIONE	FASI DI DEGENERAZIONE	FASI NEOPLASTICHE
ECTODERMA	a) Epidermide	1. FASI DI IMBIBIZIONE ECTODERMALE (tessuto ectodermale) a) Fasi di imbibizione epidermale (epidermide): Morbo di Addison - Melanoma, pigmentazione - Prurigo - Prurito semplice, prurito vulvare - Ustioni - Trattamenti terapeutici epidermici di qualsiasi tipo (pomate contenenti salicilati o mercuriali, formaldeide, pennellature con catrame, raggi X, ecc.) - Sindrome di adattamento (ipofisi).	1. FASI DI DEGENERAZIONE ECTODERMALE (nell'ectoderma) a) Fasi di degenerazione epidermale (nell'epidermide): Lupus vulgaris ed eritematoses, Lebbra, Pemfigo vulgaris - Irtiosi - Elefantiasi della pelle - Tubercoloide - Leucoplasia delle labbra - Morbo di Paget delle mammelle - Acromegalia (ipofisi) - Distrofia adiposo-genitale - Cachessia di Simmond - Sindrome di Cushing, ecc. - Psoriasi, ecc.	1. FASI NEOPLASTICHE ECTODERMALI (nel tessuto ectodermale) a) Fasi neoplastiche epidermiche (nell'epidermide): Ulcus - Basalioma - Adenoma delle ghiandole sudoripare - Melanoma - Melanosarcoma - Sarcoma cutaneo multiplo idiopatico - Tumore ipofisario, ecc.
	b) Oroderma	b) Fasi di imbibizione orodermale (nell'oroderma): in genere evolve velocemente nella fase di espulsione, perché il tessuto orodermale ha una marcata funzione di valvola di sfogo - Rinite vasomotoria - Raffreddore da fieno - Rinite atrofica - Leucoplasia (passaggio nella fase di degenerazione) ecc.	b) Fasi di degenerazione orodermale (nell'oroderma): Ozena, Rinite Atrofica - Leucoplasia della lingua - Lupus della mucosa nasale, ecc.	b) Fasi neoplastiche oroderma (dell'oroderma): Carcinoma della mucosa nasale ed orale, delle labbra e della faccia superiore della lingua, ecc.
	c) Neuroderma	c) Fasi di imbibizione neurodermale (nel neuroderma): Nevralgia iniziale del trigemino - Nevralgia del braccio, intercostale - Ischialgia - Nevralgia del funicolo spermatico ecc. - Paralisi iniziale e debolezza di innervazione - Neurite tossica, per esempio anche a carico del nervo acustico in seguito ad intossicazione da salicilati, chinino, alcool, nicotina e piombo, ecc. - Ipoacusia, ronzii auricolari - Epilessia, sclerosi multipla e altre malattie organiche nervose - Danni alla membrana intima delle arterie che contiene i recettori simpatici.	c) Fasi di degenerazione neurodermale (nel neuroderma, in parte sono identiche sul simpaticoderma): Atrofia del nervo ottico, sclerosi multipla, parkinsonismo, siringomielia - Sclerosi laterale amiotrofica - Atassia ereditaria - Paralisi bulbare progressiva - Stadio degenerativo della poliomielite epidemica - Neurofibrosi (Recklinghausen) - Encefalomalachia (mesenchima perivasale) - Metaleu cerebrospinale, Tabe e paralisi - Epilessia - Paralisi agitante - Schizofrenia - Paranoia - Paralisi periferica nervosa - Forme di otosclerosi, vertigini, morbo di Menière, mielosi funicolare, ecc.	c) Fasi neoplastiche neuroderma (nel neuroderma): Neurodermia, neurinoma, glioma, gliosarcoma, ecc.
	d) Simpaticoderma	d) Fasi di imbibizione simpaticodermale (sul tessuto simpatico): predisposizione costituzionale e cellulare per la genesi di arteriosclerosi, artrite, gangrena, angina pectoris, asma bronchiale, polipnosi, ulcera duodenale, gastrica e ventricolare. Erisipela, sclerosi multipla e altri disturbi organici di origine nervosa. Lesioni all'intima delle arterie oppure dove vi sia un recettore simpatico.	d) Fasi di degenerazione simpaticodermale (nel simpaticoderma): paralisi di qualsiasi tipo - Gangrena neurofibromatosa - Neurolue, ecc. (vedi anche fasi degenerative neuroderma), poiché la incompleta differenziazione del tessuto rende difficile una limitazione precisa), ecc.	d) Fasi neoplastiche simpaticoderma (nel simpatico): Gliosarcoma, Neurosarcoma - Neuroma (differenziazione tissutale non chiara).
MESODERMA	a) Interstizioderma	2. FASI DI IMBIBIZIONE MESODERMALE (nel mesoderma) a) Fasi di imbibizione interstiziodermale (degli organi connettivali). Primo stadio della compromissione retossica che spesso inizia nel tessuto connettivale con danni alle cellule connettivali (Mastzellen, istociti ecc.) così pure alle funzioni enzimatiche (aluronidasi). Come conseguenza di un effetto riflesso e di un effetto umorale a distanza - Localmente: elefantiasi, edema, ecc.	2. FASI DI DEGENERAZIONE MESODERMALE (nel mesoderma) a) Fasi di degenerazione interstiziodermale (nel tessuto interstiziale): Sclerodermia - Elefantiasi - Cachessia - Ipertrofia delle piccole labbra - Fibroma - Eritema nodoso - Dimagrimento e Cachessia, ecc.	2. FASI NEOPLASTICHE MESODERMALI (nel mesoderma) a) Fasi neoplastiche interstiziodermali (nel connettivo): Sarcoma di qualsiasi localizzazione, originato dal connettivo.
	b) Osteoderma	b) Fasi di imbibizione osteodermale (nelle ossa, cartilagine e dentina): Osteocondrosi, porfiria con depositi di porfirina nelle ossa - Osteite fibrosa - Periosteite - Osteomalachia - Rachitismo - Disturbi emopoietici - Primo stadio della agranulocitosi, leucemia mieloide, anemia aplastica - Saturnismo, ecc.	b) Fasi di degenerazione osteodermale (nelle ossa, la cartilagine e la dentina): Osteomalacia, rachitismo - Suppurazione attraverso un tragitto fistoloso di un focolo osseo tubercolotico - Tubercolosi ossea - Coxite tubercolare - Spodilite tubercolosa - Osteite fibrosa - Nefrosi forforica del mascellare - Stadio finale della parodontosi, ecc.	b) Fasi neoplastiche osteoderma (nell'osteoderma): Osteosarcoma di qualsiasi localizzazione, ecc.
	c) Emoderma	c) Fasi di imbibizione emodermale (nei vasi, nel cuore e negli eritrociti): Danni miocardici, miocardite - Aritmia - Tachicardia parossistica - Spasmo coronario - Neurosi cardiaca dopo trattamento irrigante di un'eczema, ecc. - Debolezza cardiaca - Ingrossamento della mitra in seguito a malaria (in parte fasi di infiammazione); nel morbo di Banti, lue arteriosa - Aneurisma aortico (ingresso nella fase degenerativa) - Cloranemia achilica - Clorosi - Anemia di qualsiasi tipo, policitemia - Reticolosi, leucemia aleucemica - Diatesi emorragica - Malattia di Werlhoff - Porpora emorragica e fulminante - Dermatopatie di qualsiasi tipo Malattia petecchiale - Arteriosclerosi costituzionale - Claudicatio intermittens - Endoangioliite obliterante - Periartrite nodosa - Gangrena di Raymond - Agranulocitosi (passaggio nelle fasi degenerative).	c) Fasi di degenerazione emodermale (nel cuore, sui vasi, sugli eritrociti): Pannielottiti - Anemia aplastica - Mielosi cronica - Leucemia linfatica e leucemica - Agranulocitosi - Diatesi emorragica - Malattie del sangue - Gangrena di Raynaud - Lue vasale - Alterazione vasale nei casi di TBC militare - Anemia perniciosa progressiva - Apoplessia cerebrale - Pachimeningite emorragica, ecc.	c) Fasi neoplastiche emoderma (nell'emoderma): Mieloma multiplo - Angioma - Angiosarcoma, ecc.
	d) Linfoderma	d) Fasi di imbibizione linfodermale (del linfoderma): Gonfiore delle ghiandole linfatiche, elefantiasi (interstiziodermale). Forme croniche di tonsillite, oppure imbibizione retossiche che comportano ipertrofia e gonfiore ghiandolare, in parte da interpretare come regressioni nello stadio di espulsione - Terreno costituzionale per la leucemia linfatica, la linfogranulomatosi e linfoblastoma.	d) Fasi di degenerazione linfodermale (del tessuto linfatico): Linfadenosi cronica - Linfogranulomatosi (linfoma maligno) - Reticolosi, ecc.	d) Fasi neoplastiche linfoderma (nel linfoderma): Linfosarcoma - Linfoglioma, ecc.
	e) Cavoderma	e) Fasi di imbibizione cavodermale (delle cavità mesenchimali): terreno predisposto per lo sviluppo di idropi delle ossa, idrocefalo interno cronico, pachimeningite emorragica, emorragia subaracnoidea, tubercolo solitario, ecc.	e) Fasi di degenerazione cavodermale (nelle cavità mesenchimali): Osteoatrofia deformante - Tubercolosi delle articolazioni - Coxite da TBC - Tubercolosi cerebrale (neuroderma, interstiziodermale), ecc.	e) Fasi neoplastiche cavoderma (nel cavoderma): sarcoma della cartilagine e delle meningi, ecc.
	f) Nefroderma	f) Fasi di imbibizione nefrodermale (dei reni, della corteccia surrenale e dell'uretere); fasi iniziali di esaurimento secondo Selyes. Albuminuria (benigna). Rene da gravidanza - Primo stadio di nefrosi - Ematuria, ecc.	f) Fasi di degenerazione nefrodermale (nel rene, uretere e corteccia surrenale): Rene grinzoso cronico e nefrosi - Glomerulo - Nefrite cronica - Rene grinzoso secondario - Tubercolosi del rene e degli organi urinari - Morbo di Addison - Fase di esaurimento secondo Selyes, ecc.	f) Fasi neoplastiche nefroderma (nel nefroderma): Iponefrosi, sarcoma e carcinoma dei reni, ecc.
	g) Sieroderma	g) Fasi di imbibizione sierodermale (delle membrane sierose): Versamento sieroso - Pleurite essudativa - Pericardite e peritonite, oppure stadio preliminare del loro sviluppo.	g) Fasi di degenerazione sierodermale (nel sieroderma): Tubercolosi della pleura, del pericardio e del peritoneo, ecc.	g) Fasi neoplastiche sieroderma (nel sieroderma): Carcinoma e sarcoma delle sierose, ecc.
	h) Germinoderma	h) Fasi di imbibizione germinodermale (nel tessuto delle gonadi, dell'utero, della vagina, dell'uretere): Stadi preliminari di cisti ovarica, mioma uterino (da intendersi come fase di deposito sul Locus minoris resistentiae) - Annessite e parametri, collegati a repressione di una manifestazione di Fluor, Epididimite gonorrhoa, spermacistite (in direzione della fase di infiammazione) - Tendenza a impotenza, vaginite e sacralgia con un legame ginecologico - Induratio penis plastica, ecc.	h) Fasi di degenerazione germinoderma (nel germinoderma): Tubercolosi delle tube, delle ovaie e dei testicoli - Atrofia di questi organi - Impotenza virile - Sterilità - Climaterio precoce, ecc.	h) Fasi neoplastiche germinoderma (nel germinoderma): Carcinoma dell'utero, delle ovaie, dei testicoli, della prostata, ecc.
	i) Muscoloderma	i) Fasi di imbibizione muscolodermale (nella muscolatura): Terreno costituzionale per la atrofia muscolare progressiva, miogelosi, boriste calcarea, mioste ossificante, ecc.	i) Fasi di degenerazione muscoloderma (nella muscolatura): Distrofia muscolare progressiva, ecc.	i) Fasi neoplastiche muscoloderma (nel tessuto muscolare): Neoformazioni muscolari, miosarcomi, ecc.
ENDODERMA	a) Mucoderma	3. FASI DI IMBIBIZIONE ENDODERMALE (dell'endoderma) a) Fasi di imbibizione mucodermale (nelle membrane endodermali): Raucedine, enfisema, achilia gastrica, ecc.	3. FASI DI DEGENERAZIONE ENDODERMALE (nell'endoderma) a) Fasi di imbibizione mucodermale (nelle mucose): tubercolosi della laringe, dei polmoni, dell'intestino, Poliposi intestinali, ecc.	3. FASI NEOPLASTICHE ENDODERMALI (nell'endoderma) a) Fasi neoplastiche mucoderma (sulle mucose endodermali): Carcinoma delle laringe, dell'esofago, dello stomaco, dell'intestino, del retto e dei bronchi, così anche adenocarcinomi delle altre mucose di origine endoderma, stenosi intestinale e ileo nei casi di carcinoma - Carcinoma vulvare - Tumore della parotide, ecc.
	b) Organoderma	b) Fasi di imbibizione organoderma (negli organi endodermali): Danni della funzionalità epatica e lesioni epatiche tossiche - Anoressia - Icttero epatocellulare - Atrofia epatica giallo acuta (ingresso nella fase degenerativa) - Ipertiroidosi (base dov) - Tetania (paratiroides), ecc.	b) Fasi di degenerazioni organoderma (nell'endoderma): Cirrosi epatica atrofica - Diabete mellito - Lue epatica - Fegato amiloide - Fegato grasso - Atrofia epatica giallo acuta - Pancreatite cronica, sclerotica - Ipotiroidismo, creatinismo, mixedema, ecc.	b) Fasi neoplastiche organoderma (nell'organoderma): Carcinoma del fegato, del pancreas, della cistifellea, della tiroide, del timo e della parotide, ecc.